



# Ε Μ Γ Ε

Ελληνική Μαιευτική και  
Γυναικολογική Εταιρεία

Κατευθυντήρια Οδηγία  
No 57γ  
Οκτώβριος 2022

## ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ: ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΔΟΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ SARS-COV-2

### Ψαρρής Αλέξανδρος

Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Αθήνα

### Σύνδος Μιχαήλ

Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Αθήνα

### Δασκαλάκης Γεώργιος

Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Αθήνα

Σε συνέχεια της προηγούμενης οδηγίας No 57 και No 57β, με δεδομένο ότι η κύηση αποτελεί παράγοντα αυξημένης νοσηρότητας από COVID-19, προτείνεται όλες οι έγκυες να εμβολιάζονται με αναμνηστική δόση των εμβολίων έναντι SARS-CoV-2, ακολουθώντας τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (1). Η χορήγηση αναμνηστικής δόσης αφορά τα διδύναμα εμβόλια έναντι του αρχικού στελέχους του SARS-CoV-2 και των υποπαραλλαγών Όμικρον BA.1, Όμικρον BA.4/BA.5. Τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση από τον European Medicine Agency για χορήγηση ως αναμνηστική δόση μετά την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος έναντι SARS-CoV-2, είναι εμβόλια τεχνολογίας mRNA (Comirnaty-Spikevax)(2). Τα εμβόλια αυτά δεν περιέχουν ζώντες εξασθενημένους μικροοργανισμούς και δεν έχουν αντένδειξη χορήγησης κατά την κύηση. Η παρούσα σύσταση βρίσκεται σε συμφωνία με τις συστάσεις διεθνών φορέων όπως το Center for Disease Control and Prevention και το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων (ACOG) (3-5). Η αναμνηστική δόση με τα διδύναμα εμβόλια χορηγείται 3 μήνες μετά την τελευταία δόση του εμβολίου ή τη νόσηση από κορωνοϊό, σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει το βασικό εμβολιαστικό σχήμα (1).

1. Σύσταση ΕΕΕ για τη χορήγηση αναμνηστικής δόσης με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια έναντι του κορωνοϊού.
2. First adapted COVID-19 booster vaccines recommended for approval in the EU | European Medicines Agency. [cited 2022 Oct 11]. Available from: <https://www.ema.europa.eu/en/news/first-adapted-covid-19-booster-vaccines-recommended-approval-eu>
3. COVID-19 Vaccination Considerations for Obstetric-Gynecologic Care | ACOG. [cited 2022 Oct 11]. Available from: <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/covid-19-vaccination-considerations-for-obstetric-gynecologic-care>
4. COVID-19 Vaccines While Pregnant or Breastfeeding. [cited 2022 Oct 11]. Available from: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html>
5. Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines | CDC. [cited 2022 Oct 11]. Available from: <https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html>

Οι κατευθυντήριες οδηγίες που αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες/κείμενα Μαιευτικών και Γυναικολογικών Εταιρειών του εξωτερικού προσαρμοσμένες στην Ελληνική πραγματικότητα και για τη σύνταξή τους χρησιμοποιούνται έγκυρες βιβλιογραφικές αναφορές.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις και δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν την κλινική κρίση του θεράποντος γιατρού. Η περίπτωση κάθε ασθενούς είναι ξεχωριστή και ο γιατρός οφείλει να προσαρμόσει την επιστημονική γνώση στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου περιστατικού.